КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

Вакцинация и пассивная иммунизация

Sprache: Russisch

Вакцинация и пассивная иммунизация должна быть проведена как можно раньше.
Целесообразно проверять статус вакцинации в любом возрасте. Пропущенные прививки необходимо немедленно восполнить согласно рекомендациям для соответствующего возраста.

Рекомендации постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



ПОЯСНЕНИЯ

- **G БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ** *(до 3-х частичных прививок G1 - G3)*
- **S СТАНДАРТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ**
- **A РЕВАКЦИНАЦИЯ**
- **N ПОСЛЕДУЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ** *(Базовая иммунизация всех еще не вакцинированных или Завершение неполной серии вакцинаций)*
- **U Скрининговое обследование**
- **J Обследование подростков** *(J1 в возрасте 12–14 лет)*

[a] **PCB (моноклональные антитела):** Родившиеся в период с апреля по сентябрь должны получить нирсевимаб осенью, перед началом первого сезона PCB; Новорожденные любого гестационного возраста, родившиеся в сезон PCB (обычно с октября по март), должны получить нирсевимаб в кратчайшие сроки после рождения, в идеале при выписке из родильного дома или в период U2 (с 3 по 10 день жизни)

[b] **Rota:** Первая доза вакцины с 6-недельного возраста, в зависимости от используемой вакцины, 2-ая или 3-я доза вакцины с интервалом не менее 4 недель.

[c] **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Недоношенные дети: дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяцев, т. е. всего 4 дозы вакцины.

[d] **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Минимальный интервал от предыдущей дозы: 6 месяцев.

[e] **MenB:** 3 дозы в возрасте от 2 до 23 месяцев; с 24 месяцев серия прививок состоит из 2 доз.

[f] **HPV:** Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, с дополнительной вакцинацией, начиная с возраста от 15 лет или с интервалом между вакцинациями менее 5 месяцев между 1-ой и 2-ой дозами требуется 3-я доза.

[g] **Td(ap):** Ревакцинация Td (против столбняка и дифтерии) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация Td — однократная вакцинация как Tdap (против столбняка, дифтерии, коклюша) или, при наличии показаний, комбинированная вакцинация Tdap-IPV (против столбняка, дифтерии, коклюша и полиомиелита).

[h] **MMR:** Одноразовая вакцинация вакциной MMR (против кори, свинки, краснухи) для всех лиц, родившихся после 1970 г. ≥ 18 лет с неясным прививочным статусом, без вакцинации или только с одной прививкой в детстве.

[i] **Pnc:** Рекомендуется использовать с PCV20.

[j] **COVID-19:** Для профилактики лиц без основного заболевания требуется (как минимум) 3 контакта с антигеном, по крайней мере один из которых должен быть вакцинацией.

[k] **H. zoster:** Двухразовая вакцинация адъювантной вакциной против опоясывающего герпеса (инактивированной вакциной) с интервалом от 2 до 6 месяцев.

[l] **PCB (вакцинация):** Однократная вакцинация в конце лета/осени перед началом сезона PCB.

* Вакцинацию можно делать в несколько приемов. MMR (против кори, свинки, краснухи) и V можно назначать в один день или с интервалом в 4 недели.

Сроки следующей вакцинации