AŞI TAKVİMİ

Aşılar ve pasif bağışıklamalar

Sprache: Türkisch

Aşılamalar ve pasif bağışıklamalar mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır.
Aşı durumunun gözden geçirilmesi her yaşta tavsiye edilir ve faydalıdır. Eksik aşılar, ilgili yaş grubu için önerilere göre derhal uygulanmalıdır.

Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) tavsiyeleri
(STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT

AŞI \ YAŞ	hafta 00	hafta 06	ay 2	ay 3	ay 4	ay 5-7	ay 8-10	ay 11*	ay 12	ay 13-14	ay 15	ay 16-23	yıl 2-4	yıl 5-6	yıl 7-8	yıl 9-11	yıl 12-14	yıl 15-16	yıl 17	yıl 18-24	yıl 25-59	yıl 60-74	yıl ≥ 75
	U2/U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J1		J2				
RSV	Monoklonal Antikorlar (Tek Doz)[a]							N															
Rotavirüsler		G1[b]		G2		(G3)																	
Tetanos[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N			A1	N		A2		N		A[g]			
Difteri[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N			A1	N		A2		N		A[g]			
Öksürüklü Boğmaca[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N			A1	N		A2		N		A3[g]		N	
Haemophilus influenzae Tip b[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N													
Çocuk felci[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N						A1		N					
Hepatit B[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N													
Pnömokok[c]			G1	N	G2	N		G3[d]		N											S[i]		
Meningokok B[e]			G1	N	G2	N			G3[e]		N												
Kızamık								G1		N		G2								S[h]			
Kabakulak, kızamıkçık								G1		N		G2											
Suçiçeği virüsü								G1		N		G2											
İnsanlarda görülen papilloma virüsleri																G1 G2[f]		N					
Meningokok ACWY																	G1		N				
COVID 19																				G[j]		S[j] (her yıl)	
Zona																					G1 G2[k]		N
Enflüanza																						S (her yıl)	
RSV (Aşılama)																							S[l]

AÇIKLAMALAR

- **G TEMEL AŞILAMA** *(3 adede kadar kısmi aşılamada G1 - G3)*
- **S STANDART AŞILAMA**
- **A TAZELEME AŞISI**
- **N TAKİP AŞILARI** *(Henüz aşılanmamış insanlar veya temel aşılama yapılacak insanlariçin tamamlanmamış bir aşılama serisinin tamamlanması)*
- **U Erken teşhis muayenesi**
- **J Gençlerde yapılan araştırma** *(12-14 yaşta J1)*

ROBERT KOCH INSTITUT

a **RSV (Monoklonal Antikorlar):** Nisan ve Eylül ayları arasında doğan bebeklere, 1. RSV sezonlarının başlamasından önceki sonbaharda nirsevimab verilmelidir; RSV sezonunda (genellikle Ekim ve Mart ayları arasında) doğacak olup herhangi bir gebelik yaşındaki yenidoğanlara, doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak doğum merkezinden taburcu edilirken veya U2 muayenesi sırasında (yaşamın 3.-10. günü) nirsevimab verilmelidir.
b **Rota:** Kullanılan aşıya bağlı olarak 6 haftalık bebeklerden itibaren en azından 4 hafta arayla 2 veya 3 aşılama dozu.
c **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Prematüre doğanlar: 3 aylıkken ek aşı dozu, yani toplam 4 aşı dozu.
d **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Önceki aşıdan sonra minimum süre: 6 ay
e **MenB:** 2 ila 23 aylıkken 3 doz; 24 aylıktan itibaren aşı serisi 2 doz olmalıdır.
f **HPV:** En azından 5 ay arayla iki aşı dozu, ≥ 15 yaştan itibaren veya 1. ve 2. Doz arasında < 5 aydan az süreyle takip aşısı yapıldığında 3. doz aşının yapılması gereklidir.
g **Td(ap):** Her 10 yılda bir Td yenileme aşısı. Daha sonraki Td aşısı bir kez Tdap olarak veya lgili endikasyon görülürse Tdap-IPV kombinasyon aşısı olarak yapılır.
h **MMR (Kızamık, kabakulak, kızamıkçık):** 1970 yılından sonra doğmuş, 18 yaşını geçkin ve aşı durumu belirsiz, aşı olmamış veya çocuklukta tek bir aşı yapılmış tüm kişiler için bir MMR aşısı ile tek seferlik aşılama yapılması gereklidir.
i **Pnc:** PCV20 ile aşılama.
j **COVID19:** Altta yatan bir hastalığı olmayan bireylerin korunması için, en az biri aşı olmak üzere (en az) 3 antijen teması gerekmektedir.
k **H. zoster:** Adjuvanlanmış zona aşısı ile en az 2 ila maksimum 6 aylık aralıklarla iki kez aşılama.
l **RSV (Aşılama):** RSV sezonu başlamadan önce yaz sonu/sonbaharda 1 kez aşı yapılması.

* Aşılar birkaç aşı randevusuna yayılabilir. MMR ve Suçiçeği aşısı aynı tarihte veya 4 hafta arayla verilebilir

Sonraki aşı tarihleri