ROBERT KOCH INSTITUT

توصيات لجنة التطعيم الدائمة
(STIKO), 2026. www.stiko.de

يجب إعطاء التطعيمات واللقاحات السلبية في أقرب وقت ممكن.
يُعد فحص حالة التطعيم أمرًا مفيدًا في كل فترة عمرية. يتعين متابعة التطعيمات الناقصة على الفور،
بناءً على التوصيات المعنية بكل فترة عمرية.

جدول التطعيم

التطعيمات
والتطعيمات السلبية

Sprache: Arabisch

التطعيم / العمر	بدءًا من عمر 75 عامًا	60-74	25-59	18-24	17	15-16	12-14	9-11	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	8-10	5-7	4	3	2	06	00
					J2		J1	U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7			U6		U5			U4		U2/U3	
الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)		الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (جرعة لمرة واحدة)[a]													N								
فيروسات الروتا																			(G3)	G2	G1[b]		
التيتانوس[c]				A[g]	N		A2		N	A1		N				G3[d]	N		G2	N	G1		
الخناق[c]				A[g]	N		A2		N	A1		N				G3[d]	N		G2	N	G1		
سعال ديكي[c]			N	A3[g]	N		A2		N	A1		N				G3[d]	N		G2	N	G1		
الإنفلونزا المستدمية من النوع ب[c]												N				G3[d]	N		G2	N	G1		
شلل الأطفال[c]			N				A1					N				G3[d]	N		G2	N	G1		
التهاب الكبد الوبائي (ب)[c]												N				G3[d]	N		G2	N	G1		
المكورات الرئوية[c]				S[i]								N				G3[d]	N		G2	N	G1		
المكورات السحائية B[e]												N			G3[e]		N		G2	N	G1		
الحصبة				S[h]					N				G2	N		G1							
النكاف، الحصبة الألمانية									N				G2	N		G1							
جدري الماء									N				G2	N		G1							
فيروس الورم الحليمي البشري						N	G1 G2[f]																
النسيرية السحائية ACWY						N	G1																
كوفيد 19				S[j] (□□□□□□)																	G[j]		
الهربس النطاقي					N	G1 G2[k]																	
الإنفلونزا					S (□□□□□□)																		
الفيروس المخلوي التنفسي (التطعيم)					S[l]																		

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

التوضيحات

- **G** التحصين الأساسي (مقسم إلى ما يصل إلى 3 جرعات جزئية من التطعيم *G1 – G3*)
- **S** التطعيم القياسي
- **A** الجرعة المنشطة
- **N** التطعيم الاستدراكي (التحصين الأساسي لكل من لم يحصلوا على التطعيم بعد أو استكمال سلسلة تطعيمات غير كاملة)
- **U** فحص الشباب (فحص *J1* بعمر يتراوح بين *12–14* سنةً)
- **J** فحص الكشف المبكر

ROBERT KOCH INSTITUT

a **الفيروس المخلوي التنفسي "RSV" (الأجسام المضادة وحيدة النسيلة):** يجب على الأطفال الذين ولدوا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الحصول على دواء نيرسيفيماب "Nirsevimab" في الخريف قبل بداية موسم الإصابة الأول بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV"؛ يجب أن يحصل المواليد الجدد في أي عمر والذين ولدوا خلال موسم العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي "RSV" (عادة في الفترة بين أكتوبر ومارس) على دواء نيرسيفيماب "Nirsevimab" في أقرب وقت ممكن بعد الولادة، ويفضل عند الخروج من مستشفى الولادة أو في U2 (الأيام من 3 إلى 10 من ولادتهم).

b **فيروس الروتا:** الجرعة الأولى من التطعيم بعمر يبدأ من 6 أسابيع، بحسب نوع التطعيم المستخدم، جرعتان أو ثلاث جرعات بفاصل زمني لا يقل عن 4 أسابيع.

c **تطعيم TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** الأطفال المبتسرون: يحصلون على جرعة تطعيم إضافية في سن 3 أشهر، أي 4 جرعات تطعيم بشكلٍ إجمالي.

d **تطعيم TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** أدنى فاصل زمني بين الجرعات: 6 أشهر.

e **MenB: 3** تطعيم جرعات بين عمر شهرين و23 شهرًا؛ من وبدءًا من عمر 24 شهرًا، تتكون سلسلة التطعيم من جرعتين.

f **فيروس الورم الحليمي البشري (HPV):** جرعتان من التطعيم بفاصل زمني لا يقل عن 5 أشهر؛ يلزم تلقي جرعة ثالثة للتطعيمات الاستدراكية بعمر يبدأ من 15 عامًا أو إذا كانت الفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية أقل من 5 أشهر.

g **Td(ap):** جرعة منشطة ضد التيتانوس والدفتريا كل 10 سنوات. تطعيم التيتانوس والدفتريا المقرر التالي يكون مرة واحدة في إطار تطعيم التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي اللاخلوي أو - في حالة توافر الأعراض المعنية - يكون في إطار تطعيم مشترك ضد التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي اللاخلوي وفيروسات شلل الأطفال غير النشطة.

h **التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR):** جرعة تطعيم واحدة من التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) لكافة المولودين بعد عام 1970 بعمر 18 عامًا أو أكثر ولم يتضح ما إذا كان قد تم تطعيمهم أو لم يتم تطعيمهم قط أو تم تطعيمهم مرة واحدة فقط خلال مرحلة الطفولة

i **التطعيم ضد المكورات الرئوية (Pnc):** التطعيم باستخدام لقاح PCV20.

j **كوفيد 19:** لحماية الأفراد الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، يلزم التعرض 3 مرات (على الأقل) للمستضدات، على أن تكون إحداها على الأقل في صورة تطعيم.

k **تطعيم الهربس النطاقي:** جرعتان من تطعيم الهربس النطاقي المعطل والمعزز بينهما فاصل زمني لا يقل عن شهرين ولا يزيد عن 6 أشهر.

l **الفيروس المخلوي التنفسي (التطعيم):** تلقي التطعيم لمرة واحدة بلقاح الفيروس المخلوي التنفسي في أواخر الصيف/الخريف قبل بداية موسم العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي

* يمكن تقسيم التطعيمات على عدة مواعيد. يمكن منح تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) والتطعيم V في نفس التاريخ أو بفاصل زمني 4 أسابيع.

مواعيد التطعيم المقبلة

.....

.....

.....