КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ

Вакцинація та пасивна імунізація

Sprache: Ukrainisch

Вакцинація та пасивна імунізація мають бути проведені якомога раніше.
Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно зробити повторно згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації (STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



ПОЯСНЕННЯ

- **G БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ** *(до 3-х часткових щеплень G1 - G3)*
- **S СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ**
- **A РЕВАКЦИНАЦІЯ**
- **N ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ** *(Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або Завершення неповної серії вакцинацій)*
- **U Скринінгове обстеження**
- **J Обстеження підлітків** *(J1 у віці 12–14 років)*

ⓐ **PCB (моноклональні антитіла):** Народжені в період з квітня по вересень повинні отримати нірсевімаб восени, перед початком першого сезону РСВ; Новонароджені будь-якого гестаційного віку, що народилися в сезон РСВ (зазвичай з жовтня по березень), повинні отримати нірсевімаб у найкоротші терміни після народження, в ідеалі при виписці з пологового будинку або в період U2 (з 3 по 10 день життя).
ⓑ **Rota:** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.
ⓒ **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.
ⓓ **TdaPHibIPV/HepB/Pnc:** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.
ⓔ **MenB:** 3 дози у віці від 2 до 23 місяців; з 24 місяців серія вакцинацій складається з 2 доз.
ⓕ **HPV:** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами потрібна 3-я доза.
ⓖ **Td(ap):** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).
ⓗ **MMR:** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.
ⓘ **Pnc:** Рекомендується з PCV20.
ⓙ **COVID-19:** Для захисту осіб без основного захворювання необхідні (принаймні) 3 контакти з антигеном, принаймні один з яких унаслідок вакцинації.
ⓚ **H. zoster:** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.
ⓛ **PCB (вакцинація):** Одноразова вакцинація наприкінці літа/осені перед початком сезону РСВ.

* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.

ТЕРМІНИ НАСТУПНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ